



# NEOPSEPHOTUS

## CLASSIFICAZIONE

**Ordine:** psittaciformes

**Famiglia:** psittacidae

**Sottofamiglia:** psittacinae

## GENERE

## SPECIE

## MUTAZIONE

neopsephotus	bourkii (Gould )	ancestrale
“	“	rosa
“	“	isabella
“	“	fulvo (fallow)



**NEOPSEPHOTUS BOURKII ( Parrocchetto di Bourke )**

Gabbia: Tipo 1                      Diametro anello: 3,5 mm

**Colore e disegno - punti 35**

**MASCHIO** - La fronte è attraversata da una sottile fascia che si estende fino agli occhi di colore blu cobalto; guance e lati del collo macchiettati di colore grigio perlato soffiati di marrone rosa; gola degradante in grigio rosa verso il petto. Zona di piume bianche attorno agli occhi e a parte del becco. Nuca, posteriore del collo, dorso, groppone, sopraccoda e copritrici alari "marroni testa di moro" bordate di marrone chiaro; petto marrone grigiastro con soffiature rosa, degradante in rosa carico verso il ventre; sottocoda azzurro carico. L'ala presenta una fascia blu, più estesa sul carpo, fino alle remiganti. Le remiganti sono nere, interrotte a metà da una zona bianca; vessilli esterni soffiati di blu viola. Barratura del sottoala assente. Timoniere centrali (n.2) nere con vessilli bluastri; le laterali sono nere alla base e diventano bianche all'apice. Becco grigio scuro che diventa nero all'apice della mandibola superiore. Occhio marrone scuro. Zampe e dita grigie. Unghie nere.

**FEMMINA** - La colorazione della femmina è meno intensa del maschio. Manca, sulla fronte, la striscia cobalto, sostituita da una sottilissima fascia bianca. Le piume biancastre intorno all'occhio e al becco sono più estese che nel maschio. La taglia è leggermente inferiore. Barratura del sottoala presente.

**Tipo strutturale e portamento - punti 20**

**MASCHIO** - Testa quasi appuntita nella parte frontale, leggermente schiacciata dalla fronte all'occipite e rotondeggiante verso la nuca. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto pieno e rotondeggiante. Linea del dorso diritta dall'occipite al codrione. Nell'insieme presenta una linea slanciata. Portamento fiero ed armonioso con posizione a 30° dalla linea verticale. Curioso, attento e non timoroso.

**FEMMINA** - Testa leggermente più piccola ed arrotondata.

**Taglia - punti 15**

Lunghezza complessiva cm. 20.

**Piumaggio - punti 15**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non devono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe, dita ed unghie - punti 10**

Zampe e dita forti e complete senza scagiosità, deformazioni ne mutilazioni; unghie complete e regolari.

**Condizioni generali - punti 5**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



### **N. BOURKII ROSA**

**MASCHIO** - La fronte è attraversata da una sottile fascia che si estende fino agli occhi blu carico; guance e lati del collo macchiettati di colore grigio perlato e soffusi di rosa; testa, dorso, groppone, petto, ventre e parte delle copritrici alari rosa carico. Zona di piume bianche attorno agli occhi e a parte del becco. Sottocoda azzurro sbiadito. L'ala presenta una fascia blu carico, più estesa sul carpo, fino alle remiganti. Le remiganti sono nere con soffusioni bruno scuro, interrotte a metà da una zona bianca. Barratura del sottoala assente. Timoniere centrali (n.2) grigio chiaro; le laterali sono grigie alla base e diventano bianche all'apice e possono avere pezzature bianche. Becco grigio chiaro, più scuro all'apice della mandibola superiore. Occhio bruno. Zampe e dita brune, eventuali pezzature non sono da penalizzare. Unghie brune.

**FEMMINA** - La colorazione della femmina è meno intensa del maschio. Sulla fronte, manca il blu, sostituito da piumette bianche. La zona blu sulle ali è meno intensa. Le piume biancastre intorno all'occhio e al becco sono più estese che nel maschio. Barratura del sottoala presente.

### **N. BOURKII ISABELLA**

**MASCHIO** - La fronte è attraversata da una fascia sottile di piume blu pastello. La testa è rosa con scaglie di marrone chiaro che la macchiettano. Il collo ed il petto sono rosa con orlature marrone. Le guance e i lati del becco sono bianco perla, il solco oculare è contornato di piumette bianche. Il ventre è rosa pallido ed il sottocoda è bianco sporco. Il dorso è caratterizzato da un color rosa-marrone molto diluito. Le ali sono coperte da piume con orlature spesse di color biscotto contornate di giallo. I margini delle ali sono blu pastello. Il groppone è marrone chiaro. Le remiganti sono grigie con soffusioni di azzurro, interrotte a metà da una zona bianca; Timoniere centrali (n.2) grigio soffuso. Le laterali sono grigie alla base e diventano bianche all'apice. Barratura del sottoala assente. Becco grigio chiaro, più scuro all'apice della mandibola superiore. Occhio rossiccio. Zampe e dita grigie. Unghie grigie.

**FEMMINA** - La colorazione della femmina è meno intensa del maschio. Mancano, sulla fronte, le piume blu, sostituite da una sottilissima fascia bianca. Spiccano di più che nel maschio, il giallo e il rosa. La zona blu sulle ali è meno intensa. Le piume biancastre intorno all'occhio e al becco sono più estese che nel maschio. La taglia è leggermente inferiore. Barratura del sottoala presente. Attenzione questa mutazione può essere confusa con la gialla .

### **N. BOURKII FULVO**

**MASCHIO** - La fronte è attraversata da una fascia sottile di piume blu tenue. La testa è bruno rosata con sfumature più chiare ai lati. con scaglie di marrone chiaro che la macchiettano. Il collo ed il petto sono bruno rosato che diventa più chiaro (rosa) sul ventre. Le guance e i lati del becco sono bianco perla, il solco oculare è contornato di piumette bianche con lievi orlature più scure. Il ventre è rosa pallido ed il sottocoda è bianco. Il dorso, partendo dal collo, è bruno contornato di color crema. I margini delle ali sono blu cobalto tenue. Nella zona delle copritrici ci sono delle orlature spesse molto regolari bruno contornate di crema chiaro. Le remiganti sono bruno soffuse di blu sul vessillo esterno. Timoniere centrali (n.2) bruno. Le laterali sono bruno alla base e diventano bianche all'apice. Barratura del sottoala assente. Becco corneo, più scuro all'apice della mandibola superiore. Occhio rosso scuro. Zampe e dita carnacine. Unghie grigio chiaro.

**FEMMINA** - La colorazione della femmina è meno intensa del maschio. Mancano, sulla fronte, le piume blu, sostituite da una sottilissima fascia bianca. La zona blu sulle ali è meno intensa. Le piume biancastre intorno all'occhio e al becco sono più estese che nel maschio. La taglia è leggermente inferiore. Barratura del sottoala presente.