



NYMPHICUS HOLLANDICUS

CLASSIFICAZIONE

Ordine: Psittaciformes
Famiglia: Cacatuidae
Sottofamiglia: Nymphicinae
Genere: Nymphicus

SPECIE	SOTTOSPECIE	MUTAZIONE
hollandicus	nessuna	grigio
“	“	pezzato
“	“	cannella
“	“	perlato
“	“	lutino
“	“	grigio F. B.
“	“	pezzato F. B.
“	“	cannella F. B.
“	“	perlato F. B.
“	“	albino F. B.



NYMPHICUS HOLLANDICUS GRIGIO

Colore e disegno - punti 35

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color giallo vivo che sfuma in bianco grigiastro ai margini. Vistoso bottone arancio vivo del diametro di cm. 1,5 circa nelle zone auricolari. Ciuffo erettile giallo con apice grigio composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca dorso ed ali di color grigio. Petto e ventre leggermente più chiari. Remiganti primarie grigio scure, quasi nere, con vessillo grigio-argenteo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione grigio. Timoniere centrali, n. 2, grigio-argenteo nella pagina superiore e nere nella inferiore, calamo grigio scuro. Timoniere laterali, n. 10, grigio scurissimo, quasi nero. Occhio nero. Becco grigio piombo, cera grigia. Zampe e dita grigio verdastro. Unghie nere.

FEMMINA - Testa, guance, collo e gola di colore grigio con rifrazioni giallastre, bordo della fronte giallo sporco. Bottone arancio sbiadito e con riflessi grigiastri. Ciuffo erettile di dimensioni inferiori di color grigio con rifrazioni giallastre. La fascia bianca dell'ala è di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie giallastre del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio con barrature orizzontali giallastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura giallastra alla pagina superiore, timoniere laterali nere con barratura gialla. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura che nell'insieme si presenta slanciata soprattutto a causa della lunga ed appuntita coda. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto pieno e rotondeggiante. Linea del dorso diritta dall'occipite al codrione, la coda si presenta normalmente in leggera caduta. Posizione a 45° dal posatoio. Curioso, attento e non timoroso.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 33.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e tantomeno essere in crescita.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete, senza scagliosità ne deformazioni o mutilazioni. Unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.

N. HOLLANDICUS PEZZATO GRIGIO

In questa categoria, sia per il maschio che per la femmina si veda la descrizione del normale grigio tenendo presente che la pezzatura, di colore giallo-avorio e bianca, può manifestarsi in qualsivoglia parte del corpo; la quantità di pezzatura chiara dovrà essere compresa tra il 60 ed il 70 per cento della superficie corporea. L'eventuale simmetria è da considerarsi pregio. Zampe e dita grigio verdastro, con possibili pezzature carnicine. Unghie nere o carnicine.



N. HOLLANDICUS CANNELLA GRIGIO

MASCHIO - Fronte ed vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color giallo vivo che sfuma in bianco crema ai margini. Vistoso bottone arancio vivo del diametro di cm. 1,5 circa nelle zone auricolari. Ciuffo erettile giallo con apice cannella composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca dorso ed ali di color grigio cannella molto scuro. Petto e ventre leggermente più chiari. Remiganti primarie bruno tenue con vessillo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione grigio cannella con leggera barratura orizzontale bianco-giallastra. Timoniere centrali, n. 2, cannella chiaro nella pagina superiore e bruno nella inferiore, calamo bruno. Timoniere laterali, n. 10, cannella. Occhio bruno scuro. Becco e cera grigio-bruna. Zampe e dita carnicine. Unghe carnicine scure.

FEMMINA - Testa, guance, collo e gola di colore cannella con rifrazioni giallastre, bordo della fronte giallo sporco. Bottone arancio sbiadito e con riflessi grigiastri. Ciuffo erettile di dimensioni inferiori di color cannella con rifrazioni giallastre. La fascia bianca dell'ala di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie giallastre del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio cannella con barrature orizzontali giallastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura giallastra alla pagina superiore, timoniere laterali cannella chiaro con barratura gialla. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.

N. HOLLANDICUS PERLATO GRIGIO

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color giallo vivo che sfuma in bianco grigiastro ai margini. Vistoso bottone arancio vivo del diametro di cm. 1,5 circa nelle zone auricolari. Ciuffo erettile giallo con apice grigio composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca dorso ed ali di color grigio fumo molto scuro, presentano una perlatura, da cui il nome della mutazione, che interessa la melanina delle penne; dette penne mantengono la melanina nel bordo e sul calamo, mentre le restanti parti assumono una tonalità di colore variabile tra il bianco giallastro ed il giallo. Questo si nota particolarmente su nuca, dorso e codrione. Petto e ventre leggermente più chiari e con perlatura più confusa e slavata. Remiganti primarie grigio scure, quasi nere, con vessillo grigio-argenteo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione grigio chiaro. Timoniere centrali, n. 2, gialle chiaro e laterali, n. 10, gialle tutte con calamo e bordo nero. Occhio nero. Becco grigio piombo, cera grigio. Zampe e dita grigio verdastro. Unghe nere.

FEMMINA - Testa, guance, collo e gola di colore grigio con rifrazioni giallastre, bordo della fronte giallo sporco. Bottone arancio sbiadito e con riflessi grigiastri. Ciuffo erettile di dimensioni inferiori di color grigio con rifrazioni giallastre. La fascia bianca dell'ala è di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie giallastre del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio con barrature orizzontali giallastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura giallastra alla pagina superiore, timoniere laterali nere con barratura gialla. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.

N. HOLLANDICUS LUTINO

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color giallo vivo che sfuma in bianco ai margini. Vistoso bottone arancio vivo del diametro di cm. 1,5 circa nelle zone auricolari. Ciuffo erettile giallo composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca, dorso, ali, petto e ventre giallo avorio il più carico ed uniforme possibile. Remiganti bianche. Codrione giallo avorio. Timoniere centrali, n. 2, bianco-avorio. Timoniere laterali, n. 10, avorio carico. Occhio rosso. Becco carnicino, cera carnicina. Zampe e dita carnicine. Unghe carnicine.

FEMMINA - Testa, guance, collo e gola di colore giallo avorio. Vistoso bottone arancio del diametro di cm. 1,5 circa nelle zone auricolari. Ciuffo erettile di dimensioni inferiori di color giallo. Nuca, dorso, petto e ventre color giallo avorio il più carico ed uniforme possibile. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie gialle del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta ed in controluce. Codrione giallo avorio con barrature orizzontali giallastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura giallastra alla pagina superiore, timoniere laterali gialle avorio con barratura bianca visibile in controluce. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.

**N. HOLLANDICUS FACCIA BIANCA GRIGIO**

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color bianco candido. Assenza completa del bottone arancio nelle zone auricolari. Ciuffo erettile bianco con apice grigio composto da 14-15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca dorso ed ali di color grigio fumo molto scuro. Petto e ventre leggermente più chiari. Remiganti primarie grigio scure, quasi nere, con vessillo grigio-argenteo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione grigio chiaro. Timoniere centrali, n. 2, grigio-argenteo nella pagina superiore e nere nella inferiore, calamo grigio scuro. Timoniere laterali, n. 10, grigio scurissimo, quasi nero. Occhio nero. Becco grigio piombo, cera grigio piombo. Zampe e dita grigie. Unghie nere.

FEMMINA - Fronte, guance, collo e parte alta della gola di colore grigio. Assenza completa del bottone arancio. Ciuffo erettile, come nel maschio ma di dimensioni inferiori, di color grigio chiaro con sbavature bianche alla base. La fascia bianca dell'ala è di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie bianche del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio con barrature orizzontali biancastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura biancastra alla pagina superiore, timoniere laterali nere con barratura bianca. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.

N. HOLLANDICUS CANNELLA FACCIA BIANCA GRIGIO

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color bianco candido. Assenza completa del bottone arancio nelle zone auricolari. Ciuffo erettile bianco con apice cannella composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca dorso ed ali di color grigio cannella. Petto e ventre leggermente più chiari. Remiganti primarie bruno tenue con vessillo argenteo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione grigio cannella con zigrinature bianche orizzontali. Timoniere centrali, n. 2, cannella chiaro nella pagina superiore e bruno nella inferiore, calamo bruno. Timoniere laterali, n. 10, cannella. Occhio bruno scuro. Becco e cera grigio bruno. Zampe unghie e dita carnicine.

FEMMINA - Testa, guance, collo e gola di colore cannella. Assenza completa del bottone arancio. Ciuffo erettile, come nel maschio ma di dimensioni inferiori, di color grigio-cannella con sbavature bianche alla base. La fascia bianca dell'ala di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie biancastre del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio cannella con barrature orizzontali biancastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura biancastra alla pagina superiore, timoniere laterali cannella chiaro con barratura gialla. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.

N. HOLLANDICUS PERLATO FACCIA BIANCA GRIGIO

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color bianco candido. Assenza completa del bottone arancio nelle zone auricolari. Ciuffo erettile bianco con apice grigio composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca dorso ed ali di color grigio fumo molto scuro, presentano una perlatura, da cui il nome della mutazione, che interessa la melanina delle penne; dette penne mantengono la melanina nel bordo e sul calamo, mentre le restanti parti assumono una tonalità di colore variabile tra il bianco candido ed il bianco sporco. Questo si nota particolarmente su nuca, dorso e codrione. Petto e ventre leggermente più chiari e con perlatura più confusa e slavata. Remiganti primarie grigio scure, quasi nere, con vessillo grigio - argenteo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione grigio chiaro. Timoniere centrali, n. 2, e laterali, n 10, bianche con calamo e bordo nero. Occhio nero. Becco grigio piombo, cera grigio piombo. Zampe e dita grigio carnicino. Unghie nere.

FEMMINA - Fronte, guance, collo e parte alta della gola di colore grigio. Assenza completa del bottone arancio. Ciuffo erettile, come nel maschio ma di dimensioni inferiori, di color grigio chiaro con sbavature bianche alla base. La fascia bianca dell'ala è di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie bianche del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio con barrature orizzontali biancastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura biancastra alla pagina superiore, timoniere laterali nere con barratura bianca. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.



N. HOLLANDICUS PEZZATO FACCIA BIANCA GRIGIO

In questa categoria, sia per il maschio che per la femmina si veda la descrizione del normale grigio a faccia bianca tenendo presente che la pezzatura, di colore bianco, può manifestarsi in qualsivoglia parte del corpo; la quantità di pezzatura chiara dovrà essere compresa tra il 60 ed il 70 per cento della superficie corporea.

L'eventuale simmetria è da considerarsi pregio.

Zampe e dita grigio verdastro, con possibili pezzature carnicine. Unghie nere o carnicine.

N. HOLLANDICUS ALBINO

MASCHIO E FEMMINA - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color bianco candido. Ciuffo erettile bianco candido composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca, dorso, ali, petto e ventre bianchi. Remiganti bianche. Codrione bianco. Timoniere centrali, n. 2, bianche. Timoniere laterali, n. 10, bianche. Occhio rosso. Becco carnicino, cera carnicina. Zampe e dita carnicine. Unghie carnicine.

NUOVE MUTAZIONI

A titolo puramente indicativo si riportano di seguito alcuni dati su nuove mutazioni non ufficialmente riconosciute dalla CTN OP.

N. HOLLANDICUS CAFE' AU LAIT

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color giallo pallido che sfuma in grigio crema molto diluito sul retro della testa con tendenza al bianco sporco. Bottone arancio molto diluito nelle zone auricolari. Ciuffo erettile giallo con apice cannella chiaro composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca e dorso color bianco sporco, ali dal bianco sporco al cannella molto chiaro. Petto e ventre leggermente più chiari. Remiganti primarie da cannella pallido a bianco sporco con vessillo argenteo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione bianco sporco con zigrinature orizzontali appena accennate. Timoniere centrali, n. 2, da cannella pallido a bianco soffuso di bruno nella pagina superiore e bruno nella inferiore, calamo bruno scuro. Timoniere laterali, n. 10, da cannella pallido a bianco soffuso di bruno. Occhio prugna scuro. Becco e cera grigio bruno.

Zampe e dita carnicine. Unghie carnicine.

FEMMINA - Testa, guance, collo e gola di colore grigio crema. Assenza completa del bottone arancio. Ciuffo erettile, come nel maschio ma di dimensioni inferiori, di color grigio-crema con sbavature bianche alla base. La fascia bianca dell'ala di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie biancastre del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio cannella con barrature orizzontali biancastre. Timoniere centrali e laterali come nel maschio ma con sottile zigrinatura biancastra alla pagina superiore. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso con una tonalità più slavata.

**N. HOLLANDICUS ARGENTO DOMINANTE**

E' la mutazione più recente che si conosca nel Nymphicus ed è anche l'unica mutazione che si conosca a comportamento genetico dominante.

MASCHIO - Fronte e vertice anteriore, guance, collo e parte alta della gola color giallo vivo che sfuma in bianco grigiastro ai margini. Vistoso bottone arancio vivo del diametro di cm. 1,5 circa nelle zone auricolari. Ciuffo erettile giallo con apice grigio composto da 14/15 piumette, partenti dalla zona frontale e che non devono interessare le arcate sopraccigliari. Nuca e retro della testa di color grigio sbiadito, dorso ed ali di color grigio argenteo pallido, da cui la denominazione "Argento". Petto e ventre proporzionalmente più chiari. Remiganti primarie grigio argenteo chiarissimo con vessillo bianco-argenteo. Grande zona bianca verso l'estremità dell'ala comprendente parte delle grandi copritrici, parte delle medie ed il vessillo delle remiganti terziarie. Codrione grigio argenteo. Timoniere centrali, n. 2, grigio-argenteo chiarissimo nella pagina superiore e grigie nella inferiore, calamo grigio chiaro. Timoniere laterali, n. 10, grigie. Occhio nero. Becco grigio piombo, cera grigia. Zampe e dita grigio scure quasi nere. Unghie nere.

FEMMINA - Testa, guance, collo e gola di colore grigio argenteo chiaro con rifrazioni giallastre, bordo della fronte giallo sporco. Bottone arancio sbiadito e con riflessi giallo-grigiastri. Ciuffo erettile di dimensioni inferiori di color grigio chiaro con rifrazioni giallastre. La fascia bianca dell'ala è di dimensioni inferiori e non ben delimitata. Remiganti primarie come nel maschio ma con da 4 a 6 macchie giallastre del diametro di cm. 0,5 nel vessillo interno, visibili, logicamente, solo ad ala aperta. Codrione grigio chiaro con barrature orizzontali giallastre. Timoniere centrali come nel maschio ma con sottile zigrinatura giallastra alla pagina superiore, timoniere laterali nere con barratura gialla. La barratura delle timoniere secondarie si estende in modo confuso e più fitto alla zona della cloaca e del basso ventre. Il resto uguale al maschio ma in complesso, al contrario della varietà comune, con una tendenza ad un colore generale più carico.

GIOVANI - Sino alla prima muta hanno colore del piumaggio più tendente al bruno ma con occhi e zampe della stessa tonalità degli adulti.

N.B. La varietà descritta sin qui descritta si riferisce al soggetto a singolo fattore, questa mutazione quando è presente in **DOPPIO FATTORE** tende a diluire ulteriormente la tonalità del corpo, risultando così di un colore generale bianco soffuso di grigio, che diventa grigio argenteo pallido su nuca, retro della testa e codrione. Il resto rimane immutato.

N. HOLLANDICUS ARGENTO DOMINANTE F. B. (PLATINO)

Non si tratta di una nuova mutazione ma di una somma di mutazioni che si sta diffondendo sotto il nome di "Platino". Per la descrizione della varietà si veda l'argento dominante, tenendo conto che la mancanza delle psittacine gialle del Faccia bianca rende la colorazione di un grigio metallico di tonalità fredda molto simile al platino di cui prende il nome; manca, naturalmente, il bottone arancio auricolare.

N. HOLLANDICUS FULVO RECESSIVO

Mutazione abbastanza recente, di colorazione generale simile al cannella ma con una tonalità più grigio-bruno, a carattere recessivo; si distingue facilmente dal cannella per la persistenza dell'occhio rosso anche nell'età adulta. Si riscontrano differenze di colorazione tra un soggetto ed un altro, anche tra novelli di una stessa nidiata; in linea generale la colorazione del maschio si presenta di tonalità più calda e profonda rispetto alla femmina. I giovani sono una copia di colore sbiadito dei genitori.