IL PADDA (Padda oryzivora) INO E MASCHERATO







Nomenclature ufficiali

Ino:

definisce tutti i soggetti mutati Ino (trasmissione ereditaria legata al sesso)

Mascherato: definisce i soggetti mutati Mascherato (trasmissione ereditaria legata al sesso)

EFFETTI **DELLE MUTAZIONI**

Aspetto fenotipico

Ino: aspetto generale biancastro per l'effetto della mutazione Ino che va a togliere tutta la eumelanina nera e la feomelanina lasciando solo un residuo di eumelanina bruna. La testa e la coda, nel quale la eu bruna è in dose superiore si mostra con un colore marrone chiaro tendente leggermente al brunastro. L'occhio è di colore rosso.

Mascherato: questa mutazione fa sì che la carica eumelanica sia nettamente ridotta rispetto all'ancestrale ed alla mutazione Agata al momento non chiaramente individuata nel Pad-

da. La notevole carica eumelanica esistente nella testa e nella coda fa si che queste due parti dell'uccello risultano nerastre, mentre il resto presenta un colore di fondo beige grigiastro. La bavetta sotto il becco ed il collarino devono risultare sempre visibili, così come lo stacco di colore fra il petto ed il ventre che mantiene una visibile carica feomelanica. Guance bianche ed occhio brunastro scuro.

Somiglianze e differenze

Ino: con nessuna delle mutazioni esistenti.

Mascherato: con il feo ed il topazio: le differenze sostanziali sono dovute alla ridotta presenza della feomelanina e alla maggiore presenza della eumelanina che andando ad inserirsi in tutte le zone che nel feo sono solo marroni le trasforma in marrone grigiastro. Il dorso è beige grigiastro, mentre nel feo lo stesso è beige chiaro senza inquinamento di grigio e nel topazio beige chiaro con solo un leggero velo grigiastro.

Per le due nuove mutazioni occorre scrivere: Padda ino e Padda mascherato



Padda Ino



Padda mascherato

Principali difetti

Struttura: taglia piccola, corpo esile e troppo allungato, testa piccola o piatta e sproporzionata su un corpo grande, collo lungo, becco piccolo o sottile o appuntito.

Disegno: irregolarità nei disegni caratteristici, stacco non preciso tra petto e ventre, collare troppo esile, guance ridotte o con margine non regolare, macchie sotto il becco nella gola, cerchio perioculare troppo esile.

Colore: troppo slavato e non saturo in base alle mutazioni, macchie melaniche nel dorso, schiarimenti di colore.Colore del petto non uniforme, colore delle remiganti depigmentato. Mancanza uniformità tra colore della testa e della coda.

Piumaggio: non aderente, non serico, piumaggio giovanile.

Portamento: nervoso e selvatico, sempre attaccato alle sbarre della gabbia, non buona tenuta del posatoio, posizione abbassata sullo stesso.

Condizioni generali: penne spezzate, piumaqgio sporco, becco e zampe con scaglie, e anellino sporco. Becco ed anello perioculare slavati (aspetto anemico).



