

# STANDARD DEL CARPODACO MESSICANO

## NOMENCLATURA UFFICIALE

Nome scientifico: *haemorrhous messicanus* / *Carpodacus messicanus* (sinonimi)

nome comune/ denominazione ufficiale : **Carpodaco messicano**

**Nota: a tale denominazione riferita alla forma tipo, si associa il nome riconosciuto dal seguente standard delle varianti cromatiche come di seguito riportato:**

**Ciuffolotto messicano** feomelanico

**Ciuffolotto messicano** torba

**Ciuffolotto messicano** grigio

**ciuffolotto messicano** opale

**Ciuffolotto messicano** mutano (indica tutte le varietà non standardizzate)

## PARTE PRIME

### INTRODUZIONE.

Il Ciuffolotto messicano è specie dimorfica ovvero presenta un dimorfismo sessuale evidente a cui si aggiunge la condizione naturale di specie politipica. Le differenze sostanziali si determinano essenzialmente nell'espressione del dimorfismo sessuale e sono rappresentate principalmente da differenze della colorazione lipocromica e dall'espressione del disegno. A tale condizione di aggiunga che il colore lipocromico rosso è funzione anche dell'alimentazione assunta. Essendo però oggi, una specie considerevolmente diffusa in allevamento e da tempo interessata da selezione domestica, è possibile determinare un modello di riferimento e uno standard di eccellenza ispirato ad una unica espressione fenotipica domestica, esattamente codificata che rappresenta sostanzialmente l'esaltazione delle caratteristiche ancestrali così come è descritto di seguito.

## DESCRIZIONE DELLA MORFOLOGIA GENERALE: Taglia , proporzioni e forma

### TAGLIA :

Per il Ciuffolotto messicano è richiesta una taglia di 13,5 cm con una tolleranza in eccesso e in difetto di mezzo centimetro.

### STRUTTURA:

*Gli esemplari di questa specie devono presentare un aspetto fiero , longilineo e slanciato, con capo squadrato ben proporzionato rispetto al corpo, dorso diritto e petto giustamente prominente e tondeggiante, ma non profondo.* E' un animale che nell'insieme deve dare la sensazione di forza e agilità.

**Ali e coda** sono lunghe e allineate alla linea dorsale, è ammessa una posizione delle ali appena abbassate quando l'animale è in allerta o eccitato.

**Capo** : nel Ciuffolotto messicano maschio è richiesto un capo di forma più squadrata e possente e un corpo più snello rispetto alla femmina, che presenta generalmente una testa più tondeggiante, ma sempre ben proporzionata rispetto ad un tronco dal profilo morbido . La fronte alta, deve mettere in evidenza nel maschio la maschera lipocromica rossa che arriva quasi fin dietro l'occhio, seguita da un evidente e preciso ciliare. Nella femmina la fronte alta metterà in evidenza l'attaccatura del disegno a cicchi. La parte superiore del capo, soprattutto nel maschio è tendenzialmente piatta così da conferire alla testa un aspetto massiccio e squadrato. Dalla nuca ha inizio la linea dorsale che senza soluzione di continuità scende regolare e dritta sulle ali, codione e coda.

**Becco** conico, breve e di colore corno, più scuro nella valva superiore, deve presentarsi ben inserito centralmente sulla linea mediale del capo.

L'**occhio** scuro, tondo e sufficientemente grande, deve essere centrale sul profilo ed inserito sempre sulla stessa linea mediale del capo.

Il Ciuffolotto messicano deve avere un aspetto fiero e vigoroso dato da una struttura muscolo -scheletrica forte ed equilibrata nelle parti, enfatizzata dalla rotondità e profondità del petto. **La linea dorsale rispetto al posatoio orizzontale forma un angolo di oltre 60°, determinando una postura decisamente verticale. Questo consente di mettere in evidenza gola e petto ed esaltare l'ampio bavaglio lipocromico rosso nel maschio e il disegno a righe della femmina.**

**Le zampe** sono giustamente alte, tenute parallele e semi estese, di colore corno scuro quasi nere. Anche le unghie sono melanizzate e scure.

### Difetti ricorrenti della struttura

- Capo piccolo, corto o serpentiforme, con fronte schiacciata.
- Struttura esile, rachitica, troppo allungata o di contro troppo tozza, con postura aquattata o eccessivamente verticalizzata.
- Gobba dorsale

- Disarmonia e sproporzioni tra la parti, accumuli di adipe su petto e/o addome.
- silhouette tondeggianti e tozza da canarino

## DISEGNI DEL MASCHIO

Nel Ciuffolotto messicano maschio si distingue un disegno di natura lipocromica e un disegno di natura melanica .

### DISEGNO LIPOCROMICO

Il maschio del Ciuffolotto messicano deve presentare un **'ampia e ben definita maschera frontale lipocromica di colore rosso intenso e brillante**, che dall'attaccatura superiore del becco si interrompe dietro l'occhio oltre il quale si realizza un evidente e ben **definito ciliare che circonda l'area auricolare senza interessarla**. Dall'attaccatura inferiore del becco deve partire un **ampio bavaglio pigmentato da lipocromo rosso intenso e brillante , che partendo dalla base del becco, deve interessare tutta l'ampiezza della gola, separatamente la porzione inferiore delle guance e del petto fino all'attaccatura col ventre**, senza debordare assolutamente sui fianchi o sull' addome. **La maschera frontale risulta separata dal bavaglio dall'area oculare non lipocromica. Le aree lipocromiche devono essere intensamente pigmentate di rosso brillante (vermiglio) e avere margini e contorni il più netti e precisi possibile**. E' tollerata una leggera soffusione lipocromica perimetrale della porzione inferiore del bavaglio, anche **se è preferibile e quindi premiabile uno stacco netto e preciso tra le parti**. Anche il groppone del maschio deve essere interessato da un intenso e brillante lipocromo rosso precisamente circoscritto nel perimetro dell'area sottesa. La presenza di lipocromo in aree non di elezione è da considerarsi difetto del colore.

**NOTA il lipocromo nel Ciuffolotto messicano deve essere sempre rosso, intenso , brillante e omogeneo.**

### Difetti ricorrenti del disegno lipocromico

- Zone di elezione lipocromica di colore smorto, torbido, pallido di colore aranciato o violaceo.
- Zone di elezione troppo ridotto, poco marcate e/o con margini eccessivamente sfumati.
- Presenza evidente di lipocromo diffuso in aree non di pertinenza quali zona auricolare, nuca, dorso, fianchi e ventre.

### DISEGNO MELANICO

**Sol fondo melanico brunastro, nel Ciuffolotto messicano maschio deve risaltare un disegno ornato preciso, continuo ed evidente, composto da striature e righe di colore nero/bruno scuro**. Superiormente (testa e dorso) il disegno deve iniziare già dal margine posteriore della maschera per arrivare al codione, area questa non interessata da questo ornamento. Le striature devono essere ordinate ed evidenti nonostante sia richiesto un fondo melanico bruno carico su cui comunque deve evidenziarsi il disegno. Inferiormente le striature melaniche sono più strette che sul dorso, ma devono risultare più evidenti perchè il fondo melanico è decisamente più chiaro rispetto a quello dorsale. Le striature devono anche **interessare simmetricamente i fianchi dove devono essere spesse, regolari e continue ( di 4-5 mm di larghezza)** . Dal margine inferiore del bavaglio (basso petto) fino quasi alla cloaca deve essere presente un

disegno sufficientemente largo, (circa 2 mm), continuo e regolare . **Ottimale è quel disegno a grani allungati e sovrapposti che vanno a formare delle righe**, che all'osservazione pare avere origine già sotto i margini delle aree lipocromiche, ma che non ne disturba i contorni e che va sfumando quasi fino alla cloaca . Il sottocoda presenta un fondo biancastro e può essere privo di striature, ma è premiabile la presenza di disegno anche in questa zona.

**NOTA** Il disegno ventrale del maschio risulta generalmente più sottile di quello femminile anche se deve essere ugualmente ben marcato e completo anche nelle parti inferiori.

**Remiganti e timoniere** devono essere uniformemente pigmentate di melanina nera/ bruno scuro. **Sulle ali è ricercata una banda alare chiara** , che si realizza per la regolare e simmetrica depigmentazione apicale delle copritrici primari dello spessore di 2-3 mm , area questa che assume tonalità beige per la presenza di feomelanina.

#### . Difetti ricorrenti del disegno melanico del maschio

Disegno irregolare, frammentato o assente.

Disegno troppo pesante .

Disegno poco evidente, confuso col fondo, troppo stretto o di colore troppo chiaro.

Presenza di orlature o brinatura (depigmentazioni apicali) su piume e penne.

#### DISEGNO MELANICO DEL CIUFFOLOTTO MESSICANO FEMMINA

Gli esemplari di sesso femminile sono caratterizzati da un **fondo melanico bruno, più scuro sulla parti superiori, su cui deve essere evidente un disegno ordinato a righe, preciso e regolare, di buona spessore (circa 2-3 mm), di colore nero/bruno più scuro del fondo**. Superiormente il disegno deve essere evidente già sul capo subito dietro l'attaccatura del becco, dove si evidenzia a chicco di riso, ordinato e nitido. Anche nella femmina **ottimale è quel disegno a grani allungati e sovrapposti che vanno a formare delle righe**. Sul dorso va ricercato un disegno più marcato e spesso, ma soprattutto continuo e regolare . **Sul fianco il disegno dovrà essere più largo (almeno 3-4 mm) di quello dorsale e soprattutto deve essere simmetrico tra i due lati**. Inferiormente il disegno a grani allungati, ordinato e regolare, della giusta larghezza (circa 2 mm) deve partire dalla gola e arrivare al ventre fin quasi alla cloaca senza interruzioni .

**Remiganti e timoniere** uniformemente pigmentate di melanina nera/ bruno scuro appena orlate di beige. **Sulle ali è ricercata una banda alare chiara**, che si realizza per la regolare e simmetrica depigmentazione apicale delle copritrici primari dello spessore di 2-3 mm , area questa che assume tonalità beige per la presenza di feomelanina.

#### DISEGNO LIPOCROMICO DEL CARPODACO MESSICANO FEMMINA

**Nelle femmine è ammessa una pigmentazione lipocromica rossa solo LIMITATA al piccolo ciliare retro auricolare e al codione. La presenza di tali parti adeguatamente colorate di lipocromo rosso non rappresenta comunque elemento di pregio aggiunto, ma va considerato come norma. Tali zone dovranno presentare giusta estensione ed adeguata intensità del lipocromo rosso . IL GROPPONE PUO NON ESSERE INTERESSATO DA LIPOCROMO, mentre il ciliare deve essere presente.**

## DIFETTI DEL DISEGNO NELLE FEMMINE

- Disegno irregolare, confuso, troppo leggero, ridotto e/o asimmetrico.
- Assenza di disegno in aree specifiche come capo, petto, fianchi o addome.
- Presenza di orlature o brinature (depigmentazioni apicali) su piume e penne.
- Aree di pigmentazione lipocromica troppo estese o indesiderate ( guance, mascherino, gola, petto, dorso).

## NOMENCLATURA UFFICIALE DELLE MUTAZIONI E LORO STANDARD.

### Ciuffolotto Messicano FEOMELANICO

Identifica gli esemplari interessati dalla classica mutazione autosomica recessiva detta "feomelanico" . In questa varietà è inibita quasi totalmente la sintesi dell'eumelanina e la sua ossidazione, determinando per compenso un'amplificazione (aumento) del residuo feomelanico. ***I soggetti interessati da questa mutazione devono presentare un fondo feomelanico carico di color beige su cui deve risaltare un disegno biancastro a grani ed a orlature*** (per effetto della melanina mancante). E' accettabile la presenza di lievi soffiusioni lipocromiche DIFFUSE che vanno ad enfatizzare il deposito feomelanico. E' condizione di eccellenza una colorazione lipocromica circoscritta alle sole zone di elezione così come è descritto nella forma tipo.

**Remiganti e timoniere** presentano la porzione centrale biancastra, contornata da un'ampia orlatura beige carico.

**Occhio rosso , becco e zampe** carnicino.

**NOTA** In questa varietà il lipocromo deve presentarsi della stessa intensità e carica del tipo base pur apparendo più chiaro.

### **Difetti ricorrenti:**

Tra i difetti ricorrenti della varietà Feomelanico, ritroviamo un'eccessiva diluizione del fondo feomelanico. Anche la presenza di un residuo disegno eumelanico, così come un fondo troppo scuro, carico ed uniforme sono difetto di colore e disegno. Assenza del disegno a chicco di grano biancastri o delle orlature sono difetti gravi del disegno. Un'intensa e diffusa soffiusione di lipocromo rosso è difetto di colore. Anche un lipocromo rosa e non rosso è da considerarsi difetto.

### Ciuffolotto messicano TORBA

Identifica gli esemplari interessati dalla mutazione autosomica recessiva, presente tipicamente solo in questa specie, che determina una **riduzione omogenea del deposito sia feomelanico che eumelanico, producendo un "appastellamento" del disegno melanico, che assume quasi lo stesso colore del fondo e con questo si uniforma e deve apparire omogeneo. I soggetti interessati da questa mutazione devono presentare un colore uniforme bruno** ( simile al fenotipo classicamente detto "pastello ma dai toni brunastri e non grigi). E' richiesta come prerogativa della varietà in questione la migliore uniformità del colore.

**Remiganti e timoniere** devono presentare un colore bruno carica omogeneo senza addensamenti melanici

**Il lipocromo rosso**, deve essere intenso e brillante come nel tipo base.

**Occhio scuro, becco e tarsi** brunastro.

#### **Difetti ricorrenti:**

Fondo melanico eccessivamente diluito, disomogeneo sul quale in modo può o meno evidente si distingue un disegno troppo marcato e scuro. Eccessivo residuo di melanina nera sull'estremità delle penne, così come la presenza antiestetica di " lunette apicali" sul dorso . Tutti questi difetti sono da penalizzare sia nella voce disegno che nella voce colore.

### Ciuffolotto messicano GRIGIO

Identifica gli esemplari interessati dalla mutazione autosomica recessiva, presente tipicamente solo in questa specie, dove determina una riduzione quasi totale della feo e una riduzione importante dell'eumelanina , con particolare riferimento alla frazione eumelanica bruna del colore di fondo e del disegno . A tale effetto si associa un miglioramento dell'ossidazione eumelanica così da determinare un disegno grigio scuro evidente, su un fondo grigio chiaro. Sono richiesti toni melanici freddi e limpidi.

**I soggetti interessati da questa mutazione devono presentare in fondo uniforme di colore grigio sul quale è ben evidente un disegno largo e completo di colore grigio scuro. Il lipocromo rosso deve presentarsi CARICO, intenso e più brillante del tipo base per la mancanza assoluta di feomelanina, ma non più chiaro o peggio rosa .**

**Remiganti e timoniere** devono presentare un deciso colore grigio scuro appena orlate di bianco perlaceo.

**Il lipocromo rosso deve presentarsi CARICO, intenso e più brillante del tipo base per la mancanza assoluta di feomelanina, ma non più chiaro o peggio rosa .**

**Occhio scuro, becco e tarsi** grigio scuro.

#### **Difetti ricorrenti:**

E' difetto del colore una manifestazione melanica brunastro con espressione palese della presenza di feomelanina. Anche un fondo troppo carico o scuro del quale non si apprezza una sufficiente diluizione delle melanine è difetto del colore, così come un disegno troppo marcato o un' infiltrazione intensa di lipocromo in aree indesiderate.

### Ciuffolotto messicano OPALE

Identifica gli esemplari interessati dalla Mutazione autosomica recessiva classica detta "opale", che determina una quasi totale inibizione della sintesi feomelanica e un forte riduzione dell'eumelanina che si presenta ossidata ma soprattutto depositata sulla porzione inferiore della barbula. Tale condizione produce una gradevole e ricercata opalescente per effetto della rifrazione. ***I soggetti interessati da questa mutazione devono presentare un fondo grigio ghiaccio limpido, su cui deve risaltare un disegno azzurrognolo evidente e completo***. E' ricercata in questa varietà la massima pulizia del fondo rispetto al lipocromo, di cui è tollerata solo una leggera soffiatura, così come è ricercato un disegno completo anche se più sottile dell'ancestrale (ridotto, ma completo).

**Remiganti e timoniere** devono presentare un colore grigio perlaceo scuro, con leggera orlatura esterna di colore biancastro

**Il lipocromo** rosso deve presentarsi carico, intenso, brillante, ma più chiaro del tipo base per la mancanza di feomelanina e la diluizione dell'eumelanina.

**Occhio** scuro, **zampe e becco** ben melanizzate di grigio scuro.

**NOTA** la chiara espressione del fenomeno di opalescenza è da considerarsi condizione di eccellenza e quindi va ricercata dalla selezione e premiata.

#### **Difetti ricorrenti:**

E' difetto di colore un' eccessiva diluizione del fondo melanico e/o del disegno che risulta appastellato. Anche la perdita dell' opalescenza è difetto del colore. Disegno troppo scuro e troppo marcato e margini delle aree lipocromiche troppo soffiute o sbavanti sono difetto del disegno. Un lipocromo rosa e non rosso è da considerarsi difetto del colore.

#### **Appendice esplicativa.**

**Rimane la non ammissione a concorso delle combinazioni e sovrapposizioni di mutazioni a garanzia della corretta selezione della specie, fatta eccezione per la combinazione di mutazione "feogrigio",** che produce un fenotipo sovrapponibile ad un apigmentato frutto dell'interazione tra la mutazione feo e la grigio, che potrà essere esposta nella categoria altre mutazioni e combinazioni ammesse, con la dicitura "**Ciuffolotto messicano feogrigio.**"\_ essendo questo, un fenotipo molto apprezzato, perfettamente identificabile, distinto e inconfondibile con ogni altra varietà se ne ammette l'esposizione. ***Tali esemplari devono presentare un piumaggio assolutamente BIANCO su cui si evidenzia un lipocromo rosso chiaro ed intenso di cui è richiesta un'esatta determinazione nelle aree di elezione, pur essendo TOLLERABILE UNA CONTENUTA SOFFIATURA DI LIPOCROMO in altre aree del piumaggio*** .

**Occhio** rosso chiaro, **becco e zampe** carnicine.

**Difetti ricorrenti:** evidente residuo melanico. Evidente, intensa e diffusa soffiatura lipocromica. Lipocromo rosa.

