

**MUTAZIONI: INO****MASCHERATO****ALLEGATO A SCHEDA STANDARD DEL PADDA****NOMENCLATURE UFFICIALI**

INO	Definisce tutti i soggetti mutati INO (Trasmissione ereditaria legata al sesso)
MASCHERATO	Definisce i soggetti mutati MASCHERATO (Trasmissione ereditaria legata al sesso)

EFFETTI DELLE MUTAZIONI

DENOMINAZIONE	ASPETTO FENOTIPICO	SOMIGLIANZE E DIFFERENZE
INO	Aspetto generale biancastro per l'effetto della mutazione Ino che va a togliere tutta la eumelanina nera e la feomelanina lasciando solo un residuo di eumelanina bruna. La testa e la coda, nel quale la eu bruna è in dose superiore si mostra con un colore marrone chiaro tendente leggermente al brunastro. L'occhio è di colore rosso.	Con nessuna delle mutazioni esistenti.
MASCHERATO	La mutazione Mascherato fa sì che la carica eumelanica sia nettamente ridotta rispetto all'ancestrale ed alla mutazione Agata al momento non chiaramente individuata nel Padda. La notevole carica eumelanica esistente nella testa e nella coda fa sì che queste due parti dell'uccello risultano nerastre, mentre il resto presenta un colore di fondo beige grigiastro. La bavetta sotto il becco ed il collarino devono risultare sempre visibili, così come lo stacco di colore fra il petto ed il ventre che mantiene una visibile carica feomelanica. Guance bianche ed occhio brunastro scuro.	Con il feo ed il topazio: le differenze sostanziali sono dovute ridotta presenza della feomelanina e alla maggiore presenza della eumelanina che andando ad inserirsi in tutte le zone che nel feo sono solo marroni le trasforma in marrone grigiastro. Il dorso è beige grigiastro, mentre nel feo lo stesso è beige chiaro senza inquinamento di grigio e nel topazio beige chiaro con solo un leggero velo grigiastro.

Per le due nuove mutazioni occorre scrivere: **Padda ino** e **Padda mascherato**

PRINCIPALI DIFETTI:

Struttura: taglia piccola, corpo esile e troppo allungato, testa piccola o piatta e sproporzionata su un corpo grande, collo lungo, becco piccolo o sottile o appuntito.

Disegno: irregolarità nei disegni caratteristici, stacco non preciso tra petto e ventre, collare troppo esile, guance ridotte o con margine non regolare, macchie sotto il becco nella gola, cerchio perioculare troppo esile.

Colore: troppo slavato e non saturo in base alle mutazioni, macchie melaniche nel dorso, schiarimenti di colore. Colore del petto non uniforme, colore delle remiganti depigmentato. Mancanza uniformità tra colore della testa e della coda.

Piumaggio: non aderente, non serico, piumaggio giovanile.

Portamento: nervoso e selvatico, sempre attaccato alle sbarre della gabbia, non buona tenuta del posatoio, posizione abbassata sullo stesso.

Condizioni generali: penne spezzate, piumaggio sporco, becco e zampe con scaglie, e anellino sporco. Becco ed anello perioculare slavati (aspetto anemico).

Anno 2010

CTN IEI: Ficeti, Caimi, Piccinini

Collaborazione: Ciccarelli Enea